

FERTILIZATOR WE TIP E 2.3 FERTILIZATOR LICHID PE BAZA DE AZOT cu aminoacizi bioactivi vegetali PENTRU UTILIZARE FOLIARA SI FERTIRIGARE
COMPOZIȚIE N-5%, P2O5-1,2%, K2O-0,75%, MgO-5%, SO3-1%, Zn-0,002%, Cu-0,001%, Fe-0,0015%,Mn-0,002%

AMINO MAX - Puterea stimulării aminoacizilor Îngrășământ mineral cu azot si aminoacizi bioactivi L (de stânga) pentru aplicare foliara și fertirigare. Întărește rezistența plantelor la stres (de exemplu, secetă, îngheț, boli) și ajută plantele să se recupereze după stres. Actionează asupra sistemului radicular al plantei crescând semnificativ masa acesteia. Reglează metabolismul și fotosinteza. Accelerează absorbția și transportul substanțelor nutritive în plante, stimulează creșterea vegetativă, mărește dimensiunea și îmbunătățește randamentul și calitatea Stimulează eficient prelucrarea azotului în plante. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați împreună cu **MAX pH+** și macro- microelemente pentru a obține stabilitatea enzimatică.

Reguli de depozitare a îngrășământului

După dizolvarea în apă, utilizați imediat, nu depozitați. Nu expuneți la temperaturi extreme (<0°C sau> 50°C). Protejați de lumina soarelui. Poate fi amestecat cu alte îngrășăminte utilizate frecvent și cu produse de protecție a plantelor. Nu amestecați cu preparate cu cupru, sulf și uleiuri. Înainte de amestecare, trebuie efectuat un test de compatibilitate, în special înainte de amestecarea cu compuși fosfor și preparate puternic alcaline. În cazul utilizării preparatelor alcaline, mai întâi diluați preparatul alcalin în apă, apoi îl introduceți în pulverizator. Fiind un produs natural, prin urmare, se poate forma un precipitat natural. Înainte de utilizare IMPERATIV trebuie să amestecați bine.

Precauții

Citiți eticheta înainte de utilizare. Agentul nu reprezintă o amenințare pentru oameni și mediu, atunci când este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Este interzis să depășiți dozele recomandate. În caz de contact direct cu pielea sau ochii, clătiți bine cu apă, în caz de vărsare pe podea, spălați cu apă. Purtați mănuși de protecție. A se păstra în loc inaccesibil copiilor. A se păstra în loc inaccesibil animalelor de casă și de fermă, a se ține departe de alimente și de sursele de apă. Depozitați la temperaturi de la + 2°C până la + 30°C. P102 Protejați departe de copii. P270 Nu mâncați, nu beți sau nu fumați atunci când utilizați acest produs.

Instrucțiuni de folosire

AMINO MAX este recomandat pentru toate tipurile de plante, culturi agricole și grădiniță. Înainte de a pregăti soluția, determinați și măsurați cantitatea necesară. **AMINO MAX** se aplică prin pulverizare sub formă de aplicare foliară sau prin fertirigare Este INTERZISĂ utilizarea în timpul secetei, înghețului. Temperatura de aplicare necesară este între 6-24°C. Este INTERZISĂ pulverizarea în timpul expunerii intensive la soare.

Cultura	Perioada aplicării	Dozare singulară [l/ha]	Cantitatea de apă [l/ha]	Apă condiționată cu pH optim
Rapiță	Toamna, de la 6-10 frunze un tratament Primăvara - începutul creșterii tulpinii principale Înainte de înflorire Pe păstăi verzi	0,5-0,75 0,75 1 1,25	160-200	4,5-5,5
Cereale de iarnă Cereale de primăvară	Toamna, la răsărire de la 4-7 frunze, un tratament Creșterea tulpinei – creșterea frunzelor Înainte de a se înspica Dezvoltarea boabelor, maturare	0,5 0,75 1 1,25-1,5	160-200	
Sfeclă de zahăr	două tratamente în faza 6 la 14 frunze, ultimul tratament cu cel puțin 4 săptămâni înainte de recoltare	1	160-200	
Cartofi	De la începutul dezvoltării frunzelor până la sfârșitul maturării, la fiecare 21-25 de zile	1,5-2	160-200	
Porumb	2-3 tratamente în faza 4-6 frunze până la creșterea în înălțime care împiedică pulverizarea	1	140-200	
Roșii, castraveți, ardei	De la a 4-a frunză până la sfârșitul maturării la fiecare 21-25 de zile	1,5 - 2	200-300	
Legume: morcovi, ceapă, pătrunjel, telina, dovleci, conopida, broccoli, fasole, mazăre verde, dovleac, varză, de Bruxelles, varză	De la începutul creșterii masei frunzelor până la sfârșitul vegetației la fiecare 21-15 zile	1,25-2	160-250	
Pajiști permanente, pajiști, pășuni, Pepiniere de culturi forestiere, peluze	Aplicați după fiecare cosire un tratament	1	160-180	
Căpsune, zmeură, coacăz, afina americana, afine	De la începutul creșterii frunzelor până la maturarea fructelor la fiecare 14-21 de zile	1-1,25	300-400	
Pomi fructiferi: măr, pere, prune, creșe, vișine și altele	De la începutul înfrunzirii până la sfârșitul maturării fructelor la fiecare 21-25 de zile	2-2,5	300-800	

NU DEPĂȘIȚI SAU NU REDUCEȚI DOZELE RECOMANDATE

Preparatul este foarte concentrat, orice depășire a dozei poate provoca deteriorarea plantelor!



HEGEN
INVESTING GROUP



NAUKOWCY / PASJONACI / BIZNESMENI



Volun: **20 L**

Data producerii: **05/2020**

Data de expirare: **05/2024**

Seria nr: **UE 469/05/20**

EC FERTILIZER

Producator:

HEGEN INVESTING GROUP

85-862 Bydgoszcz

UL.Bydgoskich Przemysłowców 6

NIP PL: **953 21 30 771**

Distributor: **SC ARGASE 1717 SRL**

310068 ARAD

Str. Luceafarului 14

CIF: **RO38439829**

Tel. **+40 729 169 142**

www.agrofertisol.ro

